Burundi : la malnutrition à Cibitoke dépasse le seuil critique de 40%

@rib News, 10/10/2013 â€“ Source XinhuaDes efforts devraient Ãªtre mobilisÃ©s dans la prÃ©vention de la malnutrition chronique en province de Cibitoke, dans l'Ouest du pays, estimÃ© Ã 50,7 %, ce qui dÃ©passe le seuil critique de 40%, a fait remarquer jeudi Ã Cibitoke le mÃ©decin provincial de la province Cibitoke, Dr Antoine Sindayigaya, lors du lancement des activitÃ©s de la semaine dÃ©diÃ©e Ã la JournÃ©e mondiale de l'alimentation, cÃ©lÃ©brÃ©e le 16 octobre de chaque annÃ©e rÃ©sultats de l'enquÃªte dÃ©mographique et de santÃ©, le taux de malnutrition aiguÃ« modÃ©rÃ© est de 4,5% et celui de malnutrition sÃ©vÃ¨re est de 2,5 %. De janvier Ã aoÃ»t 2013, les nouveaux cas d'admission ont atteint 101 cas dans les services de stabulation nutritionnelle (SST), 918 cas dans les services thÃ©rapeutiques ambulatoires (STA) et 2208 cas aux services de supplÃ©mentation nutritionnelle (SSN), a-t-il rÃ©vÃ©lÃ©.
Pour lui, les facteurs favorisant la malnutrition dans cette localitÃ© sont notamment l'insÃ©curitÃ© alimentaire. MalgrÃ© que cette province soit considÃ©rÃ©e comme grenier du pays, la grande partie de la production est destinÃ©e Ã la vente pour couvrir les autres besoins des mÃ©nages.De plus, les maladies, telles que le paludisme, les verminoses, les infections respiratoires aigues, ainsi que les mauvaises pratiques d'allaitement et de sevrage favorisent Ã©galement cette malnutrition, prononcÃ©e chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes, a-t-il encore fait savoir.