

## Burundi : le diabète, 3<sup>e</sup> cause d'hospitalisation après le paludisme et le Sida

@rib News, 13/11/2013 â€“ Source XinhuaA la veille de la journÃ©e mondiale de lutte contre le diabÃ©te, le ministÃ©re burundais de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le Sida a fait savoir mercredi que le diabÃ©te la troisiÃ©me cause d'hospitalisation aprÃ©s le paludisme et le Sida. "Dans notre pays, quelques Ã©tudes parcellaires qui ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©es montrent que le diabÃ©te est un problÃ©me majeur de santÃ© publique. Il est la 3<sup>e</sup>me cause d'hospitalisation au Centre Hospitalo-universitaire de Kamenge aprÃ©s le paludisme et le VIH/Sida", indique un communiquÃ© de presse du ministÃ©re de la SantÃ© publique.

Une campagne de dÃ©pistage du diabÃ©te organisÃ©e en 2012 menÃ©e dans les provinces de Bujumbura, Bubanza et Gitega montre que la prÃ©valence de la diabÃ©te Ã©tait de 7,7%. Elle Ã©tait de 8,4% dans les cadres du SÃ©nat, de l'AssemblÃ©e Nationale, de la prÃ©sidence et de deux vice-prÃ©sidences de la RÃ©publique. En 2011, cette prÃ©valence Ã©tait de 7,4% en commune Mugina et Rugombo de la province Cibitoke (ouest). En 2010, elle Ã©tait de 12% Ã Ngizi (nord). Le ministÃ©re burundais de la SantÃ© publique rappelle que plusieurs facteurs de risques peuvent Ãªtre Ã l'origine de la diabÃ©te, Ã savoir un rÃ©gime alimentaire dÃ©sÃ©quilibrÃ©, la sÃ©dentaritÃ©, l'urbanisation, le surpoids et l'alimentation dÃ©sÃ©quilibrÃ©e. La diabÃ©te accroÃªt considÃ©rablement les risques de graves complications Ã long terme comme les atteintes rÃ©nales, la cÃ©citÃ©, la crise cardiaque, les accidents vasculaires cÃ©rÃ©braux et les lÃ©sions neurologiques qui peuvent aboutir Ã l'amputation.