

## Burundi : Lancement d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite

Agence Anadolu, 10.06.2023 - Près de 2,7 millions d'enfants âgés de zéro à sept ans seront vaccinés entre le 10 et le 13 juin courant, selon les autorités sanitaires. La Première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a officiellement lancé ce samedi à Bujumbura, une campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants âgés de zéro à sept ans.

Selon la ministre burundaise de la Santé publique et de la lutte contre le sida, la Dre Sylvie Nzeyimana, « La détection du virus constitue une urgence de santé publique nationale et d'autres campagnes de vaccination devraient suivre dans les mois à venir afin de protéger les enfants du Burundi ». Près de 2.7 millions d'enfants seront vaccinés par voie orale contre la polio lors de cette campagne qui s'étendra sur quatre jours, a indiqué la ministre de la Santé. Sur son compte Twitter, le bureau local de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle également les parents à faire vacciner leurs enfants. « La polio est de retour ! Le pays est en épidémie ! Faisons vacciner nos enfants de 0 à 7 ans contre la poliomyélite du 10 au 13 juin 2023 pour leur donner la chance de grandir en bonne santé », a déclaré l'OMS. Le 1er mars dernier, les autorités sanitaires du Burundi avaient déclaré à « une épidémie de poliovirus circulant d'un type de souche vaccinale de type 2 (PVDVc2) ». Pour cette opération, le ministre de la Santé publique a mobilisé 12 000 agents vaccinateurs, 5 000 mobilisateurs sociaux, 900 moniteurs de suivi de la gestion du vaccin et plus de 700 superviseurs. Cette campagne de vaccination est appuyée par de nombreux partenaires du Burundi, dont l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, l'OMS, l'Unicef ainsi que l'Alliance du Vaccin, Gavi. Au Burundi, les cas de polio remontent à une trentaine d'années, selon l'OMS. La poliomyélite est une maladie virale extrêmement infectieuse qui touche en grande partie les enfants. Le virus se transmet d'une personne à l'autre principalement par voie orale. D'après l'OMS, le poliovirus circulant de type 2 est la forme de poliomyélite la plus répandue en Afrique et les épidémies de ce type de poliovirus sont les plus fréquentes dans la région, avec plus de 400 cas de paralysie flasque aiguë signalés dans 14 pays touchés en 2022. Majdi Ismail