

Burundi : la malnutrition à Cibitoke dépasse le seuil critique de 40%

ARIB News, 10/10/2013 – Source Xinhua Des efforts devraient être mobilisés dans la prévention de la malnutrition chronique en province de Cibitoke, dans l'Ouest du pays, estimée à 50,7 %, ce qui dépasse le seuil critique de 40%, a fait remarquer jeudi à Cibitoke le médecin provincial de la province Cibitoke, Dr Antoine Sindyigaya, lors du lancement des activités de la semaine d'actions de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée le 16 octobre de chaque année. Selon les résultats de l'enquête démographique et de santé, le taux de malnutrition aiguë modérée est de 4,5% et celui de malnutrition sévère est de 2,5 %. De janvier à août 2013, les nouveaux cas d'admission ont atteint 101 cas dans les services de stabulation nutritionnelle (SST), 918 cas dans les services thérapeutiques ambulatoires (STA) et 2208 cas aux services de supplémentation nutritionnelle (SSN), a-t-il révélé.

Pour lui, les facteurs favorisant la malnutrition dans cette localité sont notamment l'insécurité alimentaire. Malgré que cette province soit considérée comme grenier du pays, la grande partie de la production est destinée à la vente pour couvrir les autres besoins des ménages. De plus, les maladies, telles que le paludisme, les verminoses, les infections respiratoires aiguës, ainsi que les mauvaises pratiques d'allaitement et de sevrage favorisent également cette malnutrition, prononcée chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes, a-t-il encore fait savoir.